

野山に生息する



ダニの感染症に気をつけましょう

ダニにかまれることで感染する主な疾患

疾患名	重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	ダニ媒介脳炎	つつが虫病	日本紅斑熱	ライム病
病原体	SFTS ウイルス	ダニ媒介脳炎ウイルス	つつが虫病リッチア	日本紅斑熱リッチア	ボレリア
病原体をもつダニの種類	マダニ類	マダニ類	ツツガムシ類 (ダニの一種)	マダニ類	マダニ類
症 状	発熱、消化器症状 (嘔気、嘔吐、腹痛、 下痢、下血) など (重症化し死亡する こともある)	《中央ヨーロッパ型脳 炎》発熱、筋肉痛な どから髄膜脳炎 《アジア春夏脳炎》高 度の頭痛、発熱、悪 心のあと髄膜脳炎	発熱、発疹、全身 倦怠感、頭痛、リン パ節の腫れ、刺 し口の痂皮化	突然の高熱、全身 倦怠感、関節痛、発 疹、刺し口の 痂皮化	遊走性紅斑 神経麻痺、関節 炎、関節痛等

ダニから身を守ろう



春から初冬にかけて、シカやイノシシなどの野生動物が出没する環境や民家の裏山や裏庭、畑、あぜ道などに生息しています。

※ 家庭内に生息するダニとは異なる種類のダニです。

ダニにかまれないための服装

長袖・長ズボン、足を覆う靴等を着用し、肌の露出を少なくしましょう。服は明るい色のもの（ダニを目視で確認しやすい）がお勧めです。

その他の注意点

上着や作業着は家の中に持ち込まないようにしましょう。
シャワー時や入浴時に体にダニがついていないか確認しましょう。

ダニが吸着していたら

皮膚に吸着しているダニは無理に引き抜こうとせず、医療機関を受診しましょう。

なお、ダニにかまれてからしばらく（数日～数週間）して上記の症状が認められたら、医療機関を受診し、ダニにかまれたことを医師に教えてください。